

ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA
LUBLIN — POLONIA

VOL. XXIX, 30

SECTIO C

1974

Instytut Biologii UMCS
Zakład Botaniki Ogólnej

Bogumiła ŻABIŃSKA

Porosty rezerwatu Szum

Лишайники заповедника Шум

The Szum Reserve Lichens

Rezerwat Szum znajduje się w pobliżu wsi Górecko Kościelne na północ od Józefowa Biłgorajskiego, na pograniczu Roztocza Środkowego i Kotliny Sandomierskiej. Ciągnie się on wzdłuż doliny rzeki Szum, której zbocza pokryte są lasami.

Praca niniejsza jest częścią badań florystycznych prowadzonych w rezerwacie. Zbiorowiska roślin naczyniowych opracował Fijałkowski (4), mszaki — M a m c z a r z (5).

W badaniach prowadzonych w latach 1970—1972 stwierdzono 62 gatunki porostów. Bardzo liczne są gatunki z rodzaju *Cladonia* (27 gatunków). Często występują takie jak: *Hypogymnia physodes*, *Cetraria pinastri*, *Parmeliopsis aleurites*; z gatunków naziemnych: *Cladonia rangiferina*, *Cl. sylvatica*, *Cetraria islandica* i *Cornicularia aculeata*. Rzadziej spotyka się: *Menegazzia pertusa*, *Parmelia revoluta*, *Cetrelia cetrarioides*, *Evernia divaricata* i *Ramalina fallax*.

Oznaczone zbiory porostów znajdują się w Zielniku Zakładu Botaniki Ogólnej Instytutu Biologii UMCS.

Fijałkowski (4) wyróżnia w badanym rezerwacie 12 zespołów. W tekście użyto następujących skrótów tych zespołów:

1. Ap — *Abietetum polonicum* Dziub. 1928.
2. Ca-A — *Carici elongatae-Alnetum* Koch 1926.
3. S-c — *Salicetum pentandro-cinereae* (Almq. 1929) Pass. 1961.
4. C-F — *Carici remotae-Fraxinetum* Koch 1926.
5. C-A — *Circaealnetum* Oberd. 1953.
6. Q-P — *Quercopiceetum* Mat. 1952.

7. S-A — *Stellario-Alnetum glutinosae* (Kästn. 1938) Lohm. 1953.
8. Vm-P — *Vaccinio myrtilli-Pinetum* Kozłowska 1930.
9. Vu-P — *Vaccinio uliginosi-Pinetum* Kleist. 1929.
10. M-P — *Molinio-Pinetum* Fijałkowski.
11. L-P — *Leucobrio-Pinetum* Mat. 1962.
12. C-P — *Cladonio-Pinetum* Juraszek 1927.

Panu Profesorowi Józefowi Motyce składam serdeczne podziękowanie za sprawdzenie zbiorów i cenne uwagi.

SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW

CALICIACEAE

Coniocybe furfuracea (L.) Ach. — rzadko, na olchach w C-A.

OPEGRAPHACEAE

Opegrapha herpetica Ach. — często, na olchach w C-A i S-A.

GRAPHIDIACEAE

Graphis scripta (L.) Ach. — często, na olchach w C-A, Ca-A i Q-P.

PELTIGERACEAE

Peltigera hazslinszkyi Gyeln. — na ziemi (25 XI 1972) w Vm-P. Dotychczas nie podawana z Lubelszczyzny (det. M. Motyka-Zglobicka).

LECIDEACEAE

Lecidea scalaris (L.) Ach. — często, na sosnach w C-P, Vm-P, Vu-P i Q-P.

CLADONIACEAE

Cladonia tenuis (Floerke) Harm. — często w C-P i Vm-P, rzadziej w Q-P.

Cl. mitis Sandst. — często w C-P i Vm-P.

Cl. sylvatica (L.) Rabenh. em. Sandst. — pospolita w borze C-P.

Cl. rangiferina (L.) Web. — pospolita w C-P i Vm-P.

Cl. bacillaris Nyl. — rzadko, na pniakach w Q-P.

Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. — rzadko, na pniakach i kłodach drzew iglastych w Q-P.

Cl. digitata (L.) Schaer. — pospolita, u nasady pni, na murszejącym drewnie w C-P, Q-P, M-P i L-P.

Cl. deformis (L.) Hoffm. — rzadko, na pniakach w Q-P.

Cl. uncialis (L.) Web. — często, w borze C-P a także w Vm-P.

Cl. furcata (Huds.) Schrad. — często w C-P, Vm-P i Q-P.

Cl. rangiformis Hoffm. — często w C-P i Vm-P.

Cl. crispata (Ach.) Flot. — rzadko w Vm-P.

Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. rzadko w C-P i Vm-P.

Cl. cenotea (Ach.) Schaer. — często, na spróchniałych pniakach w C-P, Vm-P i M-P.

- Cl. glauca* Floerke — rzadko w C-P i Vm-P.
Cl. gracilis (L.) Willd. — często w C-P.
Cl. cornuta (L.) Schaer. — dość często, na pniakach i na ziemi w C-P i Vm-P.
Cl. degenerans (Floerke) Spreng. — pospolita w C-P, Vm-P, Q-P i M-P.
Cl. verticillata Hoffm. — rzadko w C-P i Vm-P.
Cl. pyxidata (L.) Fr. — rzadko w C-P.
Cl. chlorophaea (Floerke) Spreng. — pospolita, na ziemi, kłodach i pniakach w C-P, Vm-P, M-P i L-P.
Cl. fimbriata (L.) Fr. em. Vain. — pospolita w zespołach z sosną, jodłą i olchą.
Cl. minor (Hag.) Vain. — pospolita w C-P, Vm-P, Ap, Ca-A.
Cl. cornutoradiata (Coem.) Vain. — rzadko, w C-P i Vm-P.
Cl. coniocraea (Floerke) Vain. — bardzo pospolita we wszystkich zespołach z sosną, jodłą i olchą.
Cl. pityrea (Floerke) Fr. — rzadko w Vm-P i C-P.
Cl. botrytes (Hag.) Willd. — rzadko, na pniakach i kłodach drzew iglastych w Q-P.

PERTUSARIACEAE

- Pertusaria amara* (Ach.) Nyl. — bardzo pospolita w Ap, Ca-A, C-F, C-A, Q-P, S-A, na olszy.
P. globulifera (Turn.) Mass. — rzadko w Vm-P, na brzozie.
P. wulfenii D. C. — bardzo rzadko w C-A, na olszy.
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. — rzadko w C-A, na olszy.

LECANORACEAE

- Phlyctis argena* (Ach.) Flot. — bardzo pospolity, na olchach, w C-A, C-F, Q-P i S-A.
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — rzadko, na jodle w Ap.

PARMELIACEAE

- Parmeliopsis ambigua* (Wulf.) Nyl. — pospolity, na sosnach, w C-P, Vm-P i Q-P.
Parmeliopsis aleurites (Ach.) Lett. — bardzo pospolity, na sosnach w C-P, Vm-P i Q-P.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. var. *physodes* for. *eu-physodes* Maas. G. i var. *labrosa* for. *eu-labrosa* Maas. G. — bardzo pospolita we wszystkich zespołach.
H. tubulosa (Schaer.) Hav. — rzadko, na sośnie i jodle, w Vm-P.
Menegazzia pertusa (Schränk.) Stein — rzadko, na olchach, w C-A.
Parmelia furfuracea (L.) Ach. var. *olivetorina* for. *scobinosa* Hillm. — pospolita, na sośnie i jodle w Ap, C-P, Vm-P, Q-P i L-P.
P. fuliginosa (Wib.) Nyl. var. *laetevirens* (Flot.) Nyl. — rzadko, na olszy w C-F i C-A.
P. subaurifera Nyl. — rzadko, na gruszy w Vu-P.
P. revoluta Floerke — bardzo rzadko, na olszy w C-A.
P. saxatilis (L.) Ach. — bardzo rzadko, zebrana na jodle w Ap.
P. sulcata var. *sulcata* Tayl. — pospolita, na olchach w Vm-P i Q-P.
P. caperata (L.) Ach. — często, na olchach w Ca-F, C-F i C-A.

- Cetrelia cetrarioides* (Del.) Culb. — rzadko, na jodle w Ap.
C. glauca (L.) Culb. — rzadko, na jodle w Ap.
Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. — często, na olchach i jodłach w Ap.
C. pinastri (Scop.) Gray. — bardzo często, na sosnach w Vm-P, Ap.
C. islandica (L.) Ach. — bardzo pospolita w C-P i Vm-P.

USNEACEAE

- Evernia divaricata* (L.) Ach. — bardzo rzadko, na sosnach w C-P.
Bryopogon implexus (Hoffm.) Gyel. *for. infumatus* (Mot.) Bystr. — na świerkach i sosnach w C-P, Vm-P i C-A.
B. subcanus (Nyl.) Gyel. var. *subcanus* — na świerkach w C-P.
Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach. — często, w C-P i Vm-P.
Ramalina fallax Mot. — rzadko, na olszy w Ca-A i Q-P.
Usnea hirta (L.) Wigg. emend. Mot. ssp. *hirta* — bardzo częsta, na sosnach i jodłach w Ap, C-P, Vm-P i Q-P.

LICHENES IMPERFECTI

- Lepraria aeruginosa* Schaer. — pospolita, na olchach w C-A.

PIŚMIENICTWO

1. Bystrek J.: Taxonomic Studies on the Genus *Alectoria*. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska sectio C 26, 265—280 (1971).
2. Erichsen C. F. E.: Flechtenflora von Nordwestdeutschland. Stuttgart 1957.
3. Erichsen C. F. E.: *Pertusariaceae* [w:] Rabenhorst's Krypt. Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bd. 9, Abt. 5, Teil 1, Leipzig 1963.
4. Fijałkowski D.: Zespoły leśne rezerwatu krajobrazowego Szum. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska sectio C 29, 265—280 (1974).
5. Mamczarz H.: Mszaki rezerwatu krajobrazowego Szum. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska sectio C 29, 453—459 (1974).
6. Motyka J.: Porosty (*Lichenes*). 5, cz. I. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Warszawa 1960.
7. Motyka J.: Porosty (*Lichenes*). 5, cz. II. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Warszawa 1962.
8. Motyka J.: Porosty (*Lichenes*). 3, cz. II. Flora Polska. Rośliny zarodnikowe Polski i ziem ościennych. Warszawa 1964.
9. Kopaczewska E. G., Makarewicz M. F., Oksner A. N., Rassabina K. A.: Opriedielitel liszajnikow SSSR. 1, Leningrad 1971.
10. Oksner A. M.: Flora liszajnikow Ukrainy. 1, AN USSR, Kijew 1956.
11. Redinger K.: *Arthoniaceae*, *Graphidaceae* [in] Rabenhorst's. Kryptogamen Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bd. 9, Abt. 2, Teil 1, Leipzig 1937.

РЕЗЮМЕ

Исследования флоры лишайников в заповеднике Шум велись в годы 1970—1972. Установили 62 вида лишайников, в том числе 27 видов рода *Cladonia*.

К видам, встречаемым часто, принадлежат: *Hypogymnia physodes*, *Cetraria pinastri*, *Parmeliopsis aleurites*, *Cladonia rangiferina*, *Cl. sylvatica*, *Cetraria islandica*, *Cornicularia aculeata*. Виды, реже растущие: *Menegazzia pertusa*, *Parmelia revoluta*, *Cetrelia cetrarioides*, *Evernia divaricata*, *Ramalina fallax*.

S U M M A R Y

Research on the lichen flora in the Szum reserve was carried out in the years 1970 and 1972. 62 lichen species were ascertained and among them 27 species of the *Cladonia* genus.

The species which occur often are: *Hypogymnia physodes*, *Cetraria pinastri*, *Parmeliopsis aleurites*; from the overground species: *Cladonia rangiferina*, *Cl. sylvatica*, *Cetraria islandica* and *Cornicularia aculeata*. Rare species are: *Menegazzia pertusa*, *Parmelia revoluta*, *Cetrelia cetrarioides*, *Evernia divaricata* and *Ramalina fallax*.

